




Fédération Départementale **des Chasseurs**

de la Lozère

DENOMBREMENTS DES COQS CHANTEURS SUR LES VOLIERES ANGLAISES – PRINTEMPS 2009



Réalisé par le Service Technique de la FDC48

Les dénombrements des coqs chanteurs ont été réalisés courant mars et avril sous forme d'enquête auprès des chasseurs locaux ainsi que des responsables des volières.

Volière d'Aumont-Aubrac :

Personnes contactées : Claude PARATIAS, Jérôme SAGNIER, André BERTHUIT, Christian CHAPERT et Guy CHAPERT.

Un hiver long et rigoureux associé à une prédation conséquente notamment par les rapaces, ont engendré d'énormes pertes sur ces premiers oiseaux lâchés. De plus une part non négligeable des faisans a progressivement quitté la zone en réserve pour coloniser la commune voisine des Bessons où la chasse n'y était pas interdite... un élément de plus qui n'a pas arrangé la situation. A ce jour, **6 coqs chanteurs accompagnés de quelques poules sont régulièrement observés**, principalement autour de Nozières et les Crozes.

Volière de Chanac :

Personnes contactées : Bernard MAURIN, Jean-Luc FOURBES, Robert GAREL et Jean-Marc PELAT.

Comme pour Aumont, l'hiver particulièrement long et rude ainsi qu'une prédation par les rapaces ont provoqué de fortes mortalités. Toutefois, **10 coqs chanteurs ont été observés**. Sur Chanac les faisans se sont moins dispersés et sont restés dans la réserve. **A ce jour une couvée de 4 faisandeaux a été observée.**

Volière de Javols :

Personnes contactées : Michel JACOTIN, Olivier GRAVEJAT, Jean-François SARTRE et Norbert AMARGER.

Avec plus d'un mètre de neige pendant plus d'un mois, les oiseaux ont soufferts. Malgré tout, il a été constaté une légère dispersion (jusqu'à La Bessière, Longuesagne ou encore Le Montet). **12 coqs chanteurs recensés**, la plupart autour de la volière. Une couvée de **7 faisandeaux a été observée en bordure de la volière.**

Volière du Chastel – Mende :

Personnes contactées : Louis CHAPTAL, Christian ROCHER, Denis et Michel PAILLARGUE, René TONDUT et Yves JUERY.

A l'image des autres sites, la prédation et l'hiver restent les principaux points d'achoppement à la présence des faisans autour de la volière dès ce printemps. **Il a été observé 5 coqs chanteurs**. Toutefois, les caractéristiques du site avec un milieu très fermé et un relief généreux ont incontestablement conduit à une certaine sous estimation de l'effectif reproducteur par cette méthode d'enquête.