

Flash Info du Réseau Bécasse ONCFS - FNC - FDC SUIVI EN TEMPS REEL DE L'IAN* ET DE L'ÂGE-RATIO


Période 1^{er} octobre 2009 – 30 novembre 2009

*IAN : Indice d'Abondance Nocturne



Des bécasses dans l'ensemble des régions

Alors que des indices d'abondance nocturne élevés sont toujours observés dans le Nord-Ouest et le Nord-Est de la France, la répartition des migratrices s'effectue de manière relativement homogène sur l'ensemble des autres régions. Bien que la douceur des températures et une forte humidité ont marqué le mois de novembre, une partie des bécasses a rejoint les zones d'hivernage classiques, à l'exception de la région Languedoc-Roussillon. Toutefois, le mouvement migratoire est loin d'être achevé puisque des arrivées importantes ont été mentionnées début décembre dans les Ardennes.



Maintien d'un IAN fort

La carte ci-contre présente la valeur des IAN régionaux au 30 novembre, calculée à partir de l'ensemble des données de la saison en cours.



La Normandie, la Champagne-Ardenne et l'Alsace-Lorraine, et dans une moindre mesure le Nord-Pas-de-Calais - Picardie, maintiennent clairement de fortes valeurs (resp. 7,8, 7, 4,9 et 4,4), ce qui signifie que les oiseaux stationnent encore dans ces régions. En revanche, en Bourgogne - Franche-Comté une baisse de 1,2 point est enregistré par rapport au bilan précédent.

Les valeurs de l'IAN progressent partout ailleurs de 0,2 à 0,4 point ($2,6 \leq \text{IAN} \leq 3,2$) à l'exception des régions Centre - Ile-de-France et Rhône-Alpes où elles sont stables. La région Languedoc-Roussillon reste nettement en retrait.

Au 30 novembre, l'IAN général s'élève toujours à 3,7 pour un total de 1 812 heures de prospection nocturne. En 2008, et pour la même période, l'IAN était de 3,1. L'IAN moyen des 7 dernières saisons est de 2,9.

De bons IAN décadaire

Depuis le début de la saison, l'IAN décadaire enregistre des valeurs nettement supérieures à la moyenne des 7 saisons précédentes. Pour la décade du 21 au 30 novembre, l'IAN s'élève à 3,8. Il est en légère progression par rapport à la décade précédente.



Une légère remontée de l'âge-ratio

L'âge-ratio calculé à partir des captures réalisées dans la décade du 21 au 30 novembre est de 57 %, c'est à dire 2 points de plus par rapport à la précédente décade. Cependant, il est toujours inférieur de 3 points à la moyenne des 7 dernières saisons, et de 8 points par rapport à la même décade en 2008.

Globalement, depuis début octobre et sur un total de 1 926 captures, l'âge-ratio s'élève à 56 %. La valeur moyenne pour les 7 dernières saisons, et pour la même période, est de 62 %.

En résumé

L'évolution de l'IAN et de l'âge-ratio, ainsi que la meilleure répartition des oiseaux dans l'ensemble des régions, confirment le retour des adultes dans leurs sites d'hivernage. La forte valeur de l'IAN général traduit malgré tout un bon succès de la reproduction. Cependant, les conditions climatiques particulièrement douces et humides de novembre retiennent sans doute encore des jeunes en amont. L'ICA global, calculé à partir des informations récoltées auprès des chasseurs spécialisés, via Bec@notes (CNB), est proche de la moyenne de ces dernières années pour la même période (1,36 cette année ; 1,39 en 2008). Une assez forte hétérogénéité dans la répartition des oiseaux est cependant observée avec une répartition par taches particulièrement marquée.

La prévision de températures négatives sur l'ensemble de l'Europe dans les prochains jours devraient inciter les bécasses retardataires à achever leur voyage migratoire et se concrétiser dans les effectifs rencontrés lors des prochaines sorties nocturnes.

ONCFS Réseau
« Bécasse »
39 Bd Albert Einstein
CS42355
44323 NANTES Cedex 3
Tél : 02 51 25 03 99
Fax : 02 40 48 14 01

courriel:

rezobecasse@oncfs.gouv.fr